

Применение препаратов Фитоверм, КЭ в системе защиты плодовых от вредителей

Фаза развития растения						
Налив и созревание	Плод	Плод до 3,0 см	Завязь 1-2 см	Опадение лепестков	Цветение	Розовый бутон
Вредители						
Регистрация	Плодожорки, клещи, огнёвка-плодожорка			Клещи**	Клещи**	Клещи**
Производственное применение	Минирующие моли, листовертки	Минирующие моли, листовертки		Боярышниковый крылый трубочек, почковые долгоносики (жуки), яблонный пилильщик, гусеницы совок, листоверток, горностаевой шелкопрядов	Яблоневый цветоед (жуки и личинки), * яблонный пилильщик, боярышниковый краснокрылый трубочек, почковые долгоносики (жуки), гусеницы совок, листоверток, горностаевой шелкопрядов	Медяница тля**, гусеницы листоверток
Опрыскивание в период вегетации по мере появления вредителей. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га						
	Фитоверм 1% КЭ 1,2-2,4 л/га					Фитоверм 1% КЭ 1,2-2,4 л/га
	Фитоверм Экстра 5%, КЭ 0,24-0,48 л/га					Фитоверм Экстра 5%, КЭ 0,24-0,48 л/га

! — если использовать это время обработки — можно надолго избавиться от яблонного цветоседа

* - за 2-3 дня до цветения

**** Сдвоенные обработки против каждого поколения вредителей – две последовательные обработки, проводимые при высокой численности популяции или при наличии на растениях разных фаз развития вредителя одновременно. Интервал между обработками в паре составляет: при $t=25-35^{\circ}\text{C}$ – 5-6 дней, при $t=20-25^{\circ}\text{C}$ – 7-8 дней, $t=18^{\circ}\text{C}$ – 10 дней.**

Обработки растений препаратами марки Фитоверм. КЭ проводят при температуре не ниже 14°C

Применение препаратов Фитолавин, ВРК и Фармайод, ГР в системе защиты плодовых от бактериальных и вирусных заболеваний

[illegible]